

Cuadro 1: Número de hogares, mujeres y niños, y tasas de respuesta, Bolivia, 2000

| | Area | | Total |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Urban | Rural | |
| Hogares en la muestra | 2648 | 1727 | 4375 |
| Hogares ocupados | 2648 | 1727 | 4375 |
| Hogares entrevistados | 2598 | 1700 | 4298 |
| Tasa de respuesta | 98.1 | 98.4 | 98.2 |
| Mujeres elegibles | 3037 | 1579 | 4616 |
| Mujeres entrevistadas | 2963 | 1548 | 4511 |
| Tasa de respuesta | 97.6 | 98.0 | 97.7 |
| Niños menores de cinco años | 1958 | 1445 | 3403 |
| Niños entrevistados | 1950 | 1438 | 3388 |
| Tasa de respuesta | 99.6 | 99.5 | 99.6 |

Cuadro 2: Distribución de la población por edad en años simples y por sexo, Bolivia, 2000

| Edad en años | | Sexo | | | |
|--------------|----|---------|------------|---------|------------|
| | | Hombres | | Mujeres | |
| | | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje |
| Edad | 0 | 337 | 3.6 | 372 | 3.8 |
| | 1 | 331 | 3.6 | 312 | 3.2 |
| | 2 | 335 | 3.6 | 291 | 3.0 |
| | 3 | 282 | 3.0 | 299 | 3.0 |
| | 4 | 309 | 3.3 | 306 | 3.1 |
| | 5 | 292 | 3.2 | 280 | 2.9 |
| | 6 | 279 | 3.0 | 287 | 2.9 |
| | 7 | 243 | 2.6 | 243 | 2.5 |
| | 8 | 271 | 2.9 | 294 | 3.0 |
| | 9 | 219 | 2.4 | 208 | 2.1 |
| | 10 | 254 | 2.7 | 277 | 2.8 |
| | 11 | 229 | 2.5 | 185 | 1.9 |
| | 12 | 209 | 2.3 | 256 | 2.6 |
| | 13 | 224 | 2.4 | 229 | 2.3 |
| | 14 | 230 | 2.5 | 201 | 2.0 |
| | 15 | 171 | 1.9 | 205 | 2.1 |
| | 16 | 172 | 1.9 | 177 | 1.8 |
| | 17 | 140 | 1.5 | 166 | 1.7 |
| | 18 | 168 | 1.8 | 222 | 2.3 |
| | 19 | 148 | 1.6 | 197 | 2.0 |
| | 20 | 206 | 2.2 | 199 | 2.0 |
| | 21 | 140 | 1.5 | 178 | 1.8 |
| | 22 | 156 | 1.7 | 174 | 1.8 |
| | 23 | 168 | 1.8 | 180 | 1.8 |
| | 24 | 133 | 1.4 | 177 | 1.8 |
| | 25 | 154 | 1.7 | 175 | 1.8 |
| | 26 | 100 | 1.1 | 156 | 1.6 |
| | 27 | 132 | 1.4 | 146 | 1.5 |

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 28 | 139 | 1.5 | 158 | 1.6 |
| 29 | 107 | 1.2 | 125 | 1.3 |
| 30 | 194 | 2.1 | 159 | 1.6 |
| 31 | 82 | .9 | 129 | 1.3 |
| 32 | 144 | 1.6 | 137 | 1.4 |
| 33 | 114 | 1.2 | 101 | 1.0 |
| 34 | 77 | .8 | 110 | 1.1 |
| 35 | 123 | 1.3 | 140 | 1.4 |
| 36 | 104 | 1.1 | 112 | 1.1 |
| 37 | 91 | 1.0 | 97 | 1.0 |
| 38 | 119 | 1.3 | 126 | 1.3 |
| 39 | 92 | 1.0 | 100 | 1.0 |
| 40 | 141 | 1.5 | 119 | 1.2 |
| 41 | 50 | .5 | 69 | .7 |
| 42 | 110 | 1.2 | 80 | .8 |
| 43 | 65 | .7 | 78 | .8 |
| 44 | 56 | .6 | 91 | .9 |
| 45 | 109 | 1.2 | 107 | 1.1 |
| 46 | 75 | .8 | 55 | .6 |
| 47 | 72 | .8 | 68 | .7 |
| 48 | 91 | 1.0 | 97 | 1.0 |
| 49 | 63 | .7 | 42 | .4 |
| 50 | 87 | .9 | 122 | 1.2 |
| 51 | 39 | .4 | 41 | .4 |
| 52 | 63 | .7 | 66 | .7 |
| 53 | 45 | .5 | 52 | .5 |
| 54 | 39 | .4 | 54 | .6 |
| 55 | 70 | .8 | 74 | .7 |
| 56 | 48 | .5 | 43 | .4 |
| 57 | 33 | .4 | 28 | .3 |
| 58 | 55 | .6 | 42 | .4 |
| 59 | 16 | .2 | 29 | .3 |
| 60 | 71 | .8 | 87 | .9 |
| 61 | 17 | .2 | 14 | .1 |
| 62 | 29 | .3 | 31 | .3 |

| | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|
| 63 | 23 | .2 | 34 | .3 |
| 64 | 19 | .2 | 17 | .2 |
| 65 | 46 | .5 | 62 | .6 |
| 66 | 20 | .2 | 21 | .2 |
| 67 | 34 | .4 | 21 | .2 |
| 68 | 28 | .3 | 42 | .4 |
| 69 | 20 | .2 | 23 | .2 |
| 70 | 28 | .3 | 41 | .4 |
| 71 | 18 | .2 | 11 | .1 |
| 72 | 23 | .2 | 30 | .3 |
| 73 | 13 | .1 | 8 | .1 |
| 74 | 11 | .1 | 7 | .1 |
| 75 | 18 | .2 | 24 | .2 |
| 76 | 5 | .1 | 16 | .2 |
| 77 | 5 | .1 | 5 | .1 |
| 78 | 12 | .1 | 14 | .1 |
| 79 | 1 | .0 | 4 | .0 |
| 80 | 22 | .2 | 33 | .3 |
| 81 | 4 | .0 | 3 | .0 |
| 82 | 2 | .0 | 12 | .1 |
| 83 | 7 | .1 | 2 | .0 |
| 84 | 2 | .0 | 1 | .0 |
| 85 | 3 | .0 | 2 | .0 |
| 86 | 3 | .0 | 5 | .1 |
| 87 | 0 | .0 | 4 | .0 |
| 88 | 1 | .0 | 4 | .0 |
| 89 y mas | 6 | .0 | 10 | .0 |
| Faltante | 0 | .0 | 1 | .0 |
| | 14 | .2 | 5 | .1 |
| Total | 9251 | 100.0 | 9837 | 100.0 |

Cuadro 4: Distribución de hogares por características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | Porcentaje | Ponderado | Sin ponderar |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Region | Altiplano | 45.1 | 1974 | 1986 |
| | Valle | 30.3 | 1326 | 1583 |
| | Llano | 24.6 | 1078 | 806 |
| Area | Urban | 66.1 | 2894 | 2648 |
| | Rural | 33.9 | 1483 | 1727 |
| Numero de miembros en el hogar | 1 | 6.8 | 294 | 270 |
| | 2-3 | 27.7 | 1193 | 1166 |
| | 4-5 | 38.0 | 1634 | 1591 |
| | 6-7 | 18.9 | 813 | 859 |
| | 8-9 | 6.7 | 287 | 321 |
| | 10+ | 1.8 | 77 | 91 |
| Total | | 100.0 | 4298 | 4298 |
| Por lo menos un niño < 15 | | 76.7 | 4298 | 4298 |
| Por lo menos un niño < 5 | | 51.9 | 4298 | 4298 |
| Por lo menos una mujer de 15-49 | | 83.4 | 4298 | 4298 |

Cuadro 4 (A): Porcentaje de hogares por características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | Area | | Total | |
|---------------------------------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| | | Urbana | Rural | | |
| Region | Altiplano | Porcentaje | 28.2 | 16.9 | 45.1 |
| | | Numero | 1236 | 738 | 1974 |
| | Valle | Porcentaje | 16.9 | 13.4 | 30.3 |
| | | Numero | 740 | 586 | 1326 |
| | Llano | Porcentaje | 21.0 | 3.6 | 24.6 |
| | | Numero | 919 | 159 | 1078 |
| Número de miembros en el hogar | 1 | Porcentaje | 3.8 | 3.0 | 6.8 |
| | | Numero | 164 | 130 | 294 |
| | 2-3 | Porcentaje | 18.6 | 9.1 | 27.7 |
| | | Numero | 801 | 392 | 1193 |
| | 4-5 | Porcentaje | 27.9 | 10.1 | 38.0 |
| | | Numero | 1201 | 433 | 1634 |
| | 6-7 | Porcentaje | 11.2 | 7.7 | 18.9 |
| | | Numero | 482 | 331 | 813 |
| | 8-9 | Porcentaje | 3.5 | 3.2 | 6.7 |
| | | Numero | 149 | 138 | 287 |
| | 10+ | Porcentaje | 1.0 | .8 | 1.8 |
| | | Numero | 41 | 36 | 77 |
| | Total | Porcentaje | 66.0 | 34.0 | 100.0 |
| | | Numero | 2838 | 1460 | 4298 |
| Por lo menos un niño < 15 | | Porcentaje | 78.1 | 74.0 | 76.7 |
| | | Numero | 2838 | 1460 | 4298 |
| Por lo menos un niño < 5 | | Porcentaje | 51.2 | 53.1 | 51.9 |
| | | Numero | 2838 | 1460 | 4298 |
| Por lo menos una mujer de 15-49 | | Porcentaje | 87.7 | 74.9 | 83.4 |
| | | Numero | 2838 | 1460 | 4298 |

Cuadro 5: Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años por características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | Porcentaje | Numero | No ponderado |
|--------------------------------|------------------|------------|--------|--------------|
| Region | Altiplano | 44.8 | 2030 | 2012 |
| | Valle | 28.9 | 1312 | 1620 |
| | Llano | 26.3 | 1192 | 877 |
| Area | Urbana | 71.5 | 3239 | 2962 |
| | Rural | 28.5 | 1294 | 1547 |
| Edad | 15-19 | 20.3 | 920 | 881 |
| | 20-24 | 19.7 | 891 | 878 |
| | 25-29 | 16.7 | 759 | 765 |
| | 30-34 | 13.9 | 629 | 630 |
| | 35-39 | 12.3 | 556 | 566 |
| | 40-44 | 9.5 | 429 | 445 |
| | 45-49 | 7.7 | 350 | 344 |
| Ha dado a luz | Si | 71.8 | 3255 | 3333 |
| | No | 28.2 | 1276 | 1175 |
| Nivel educativo de las mujeres | Ninguna | 6.7 | 305 | 373 |
| | Primaria | 41.7 | 1889 | 1985 |
| | Secundaria y más | 49.5 | 2246 | 2079 |
| | Otro | 1.8 | 84 | 63 |
| | Missing/DK | .2 | 9 | 9 |
| Total | | 100.0 | 4533 | 4509 |

Cuadro 5 (A): Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años por características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | | Area | | Total |
|--------------------------------|-----------|------------|--------|-------|-------|
| | | | Urbana | Rural | |
| Región | Altiplano | Porcentaje | 31.5 | 13.3 | 44.8 |
| | | Número | 1427 | 602 | 2030 |
| | Valle | Porcentaje | 17.1 | 11.8 | 28.9 |
| | | Número | 777 | 534 | 1312 |
| | Llano | Porcentaje | 22.8 | 3.5 | 26.3 |
| | | Número | 1035 | 157 | 1192 |
| Edad | 15-19 | Porcentaje | 14.8 | 5.5 | 20.3 |
| | | Número | 672 | 247 | 920 |
| | 20-24 | Porcentaje | 15.0 | 4.7 | 19.7 |
| | | Número | 679 | 212 | 891 |
| | 25-29 | Porcentaje | 12.5 | 4.3 | 16.7 |
| | | Número | 564 | 195 | 759 |
| | 30-34 | Porcentaje | 10.0 | 3.9 | 13.9 |
| | | Número | 454 | 175 | 629 |
| | 35-39 | Porcentaje | 8.0 | 4.3 | 12.3 |
| | | Número | 362 | 193 | 556 |
| | 40-44 | Porcentaje | 6.0 | 3.4 | 9.5 |
| | | Número | 274 | 155 | 429 |
| | 45-49 | Porcentaje | 5.2 | 2.6 | 7.7 |
| | | Número | 234 | 116 | 350 |
| Ha dado a luz | Si | Porcentaje | 49.8 | 22.0 | 71.8 |
| | | Número | 2258 | 996 | 3255 |
| | No | Porcentaje | 21.6 | 6.6 | 28.2 |
| | | Número | 979 | 298 | 1276 |
| Nivel educativo de las mujeres | Ninguna | Porcentaje | 1.5 | 5.2 | 6.7 |
| | | Número | 70 | 235 | 305 |
| | Primaria | Porcentaje | 22.5 | 19.2 | 41.7 |
| | | Número | 1020 | 869 | 1889 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|------|------|-------|
| | Secundaria y mas | Porcentaje | 45.7 | 3.9 | 49.5 |
| | | Numero | 2071 | 175 | 2246 |
| | Otro | Porcentaje | 1.7 | .2 | 1.8 |
| | | Numero | 76 | 8 | 84 |
| | Missing/DK | Porcentaje | .1 | .1 | .2 |
| | | Numero | 3 | 6 | 9 |
| Total | Porcentaje | | 71.5 | 28.5 | 100.0 |
| | Numero | | 3239 | 1294 | 4533 |

Cuadro 6: Distribución porcentual de niños menores de cinco años por edad en meses simples y características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | Porcentaje | Numero | No ponderado |
|---------------------|------------------|------------|--------|--------------|
| Sexo | Hombres | 50.3 | 1586 | 1705 |
| | Mujeres | 49.7 | 1570 | 1680 |
| Region | Altiplano | 41.6 | 1312 | 1482 |
| | Valle | 36.3 | 1145 | 1303 |
| | Llano | 22.1 | 698 | 600 |
| Area | Urbana | 61.2 | 1932 | 1948 |
| | Rural | 38.8 | 1223 | 1437 |
| Edad (meses) | .00 | .9 | 30 | 30 |
| | 1.00 | 1.8 | 57 | 57 |
| | 2.00 | 2.4 | 76 | 80 |
| | 3.00 | 1.9 | 61 | 65 |
| | 4.00 | 1.6 | 52 | 45 |
| | 5.00 | 2.3 | 72 | 65 |
| | 6.00 | 1.7 | 52 | 56 |
| | 7.00 | 1.4 | 46 | 49 |
| | 8.00 | 1.6 | 51 | 54 |
| | 9.00 | 1.6 | 50 | 54 |
| | 10.00 | 2.2 | 68 | 70 |
| | 11.00 | 1.9 | 59 | 64 |
| | 12.00 | 2.0 | 62 | 63 |
| | 13.00 | 1.8 | 56 | 62 |
| | 14.00 | 1.6 | 52 | 60 |
| | 15.00 | 1.9 | 61 | 66 |
| | 16.00 | 1.7 | 52 | 53 |
| | 17.00 | 1.7 | 53 | 63 |
| | 18.00 | 2.2 | 71 | 71 |
| | 19.00 | .8 | 26 | 29 |
| | 20.00 | 1.7 | 53 | 54 |
| | 21.00 | 1.6 | 50 | 56 |
| 22.00 | 1.4 | 46 | 55 | |

| | | | |
|--------------|-----|----|----|
| 23.00 | 1.9 | 61 | 59 |
| 24.00 | 2.1 | 65 | 70 |
| 25.00 | 1.9 | 59 | 67 |
| 26.00 | 1.6 | 50 | 54 |
| 27.00 | 1.5 | 46 | 51 |
| 28.00 | 1.8 | 58 | 60 |
| 29.00 | 1.8 | 57 | 59 |
| 30.00 | 1.7 | 54 | 50 |
| 31.00 | 1.5 | 46 | 50 |
| 32.00 | 1.3 | 41 | 49 |
| 33.00 | 1.8 | 55 | 51 |
| 34.00 | 1.6 | 51 | 52 |
| 35.00 | 1.5 | 48 | 48 |
| 36.00 | 1.2 | 39 | 44 |
| 37.00 | 1.7 | 53 | 61 |
| 38.00 | 1.8 | 55 | 68 |
| 39.00 | 1.5 | 46 | 53 |
| 40.00 | 1.6 | 51 | 55 |
| 41.00 | 1.7 | 54 | 59 |
| 42.00 | 1.5 | 46 | 51 |
| 43.00 | 1.4 | 46 | 51 |
| 44.00 | 1.3 | 39 | 41 |
| 45.00 | 1.3 | 42 | 49 |
| 46.00 | 1.7 | 55 | 62 |
| 47.00 | 1.4 | 46 | 56 |
| 48.00 | 1.7 | 55 | 64 |
| 49.00 | 1.4 | 44 | 50 |
| 50.00 | 1.9 | 60 | 61 |
| 51.00 | 1.5 | 48 | 52 |
| 52.00 | 1.8 | 57 | 55 |
| 53.00 | 1.0 | 31 | 35 |
| 54.00 | 1.7 | 52 | 57 |
| 55.00 | 1.9 | 62 | 64 |
| 56.00 | 1.7 | 55 | 60 |
| 57.00 | 1.2 | 39 | 52 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|
| | 58.00 | 1.8 | 57 | 58 |
| | 59.00 | 2.5 | 77 | 86 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instruccion | 9.4 | 295 | 358 |
| | Primaria | 51.0 | 1608 | 1768 |
| | Secundaria y mas | 38.4 | 1211 | 1225 |
| | Non-standard curriculum | 1.2 | 39 | 32 |
| | Missing/DK | .1 | 2 | 2 |
| Total | | 100.0 | 3155 | 3385 |

Cuadro 6(A): Distribución porcentual de niños menores de cinco años por edad en meses simples y características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | | Area | | Total |
|--------------|-----------|------------|--------|-------|-------|
| | | | Urbana | Rural | |
| Sexo | Hombres | Porcentaje | 30.7 | 19.5 | 50.3 |
| | | Número | 970 | 616 | 1586 |
| | Mujeres | Porcentaje | 30.5 | 19.3 | 49.7 |
| | | Número | 962 | 607 | 1570 |
| Región | Altiplano | Porcentaje | 24.2 | 17.4 | 41.6 |
| | | Número | 763 | 549 | 1312 |
| | Valle | Porcentaje | 19.7 | 16.6 | 36.3 |
| | | Número | 620 | 525 | 1145 |
| | Llano | Porcentaje | 17.4 | 4.7 | 22.1 |
| | | Número | 549 | 149 | 698 |
| Edad (meses) | .00 | Porcentaje | .5 | .5 | .9 |
| | | Número | 15 | 15 | 30 |
| | 1.00 | Porcentaje | 1.1 | .7 | 1.8 |
| | | Número | 34 | 22 | 57 |
| | 2.00 | Porcentaje | 1.7 | .7 | 2.4 |
| | | Número | 53 | 23 | 76 |
| | 3.00 | Porcentaje | 1.1 | .8 | 1.9 |
| | | Número | 35 | 26 | 61 |
| | 4.00 | Porcentaje | 1.2 | .5 | 1.6 |
| | | Número | 36 | 15 | 52 |
| | 5.00 | Porcentaje | 1.6 | .7 | 2.3 |
| | | Número | 51 | 22 | 72 |
| | 6.00 | Porcentaje | .9 | .7 | 1.7 |
| | | Número | 29 | 24 | 52 |
| | 7.00 | Porcentaje | 1.0 | .5 | 1.4 |
| | | Número | 30 | 15 | 46 |
| | 8.00 | Porcentaje | 1.1 | .5 | 1.6 |
| | | Número | 36 | 15 | 51 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|
| 9.00 | Porcentaje | 1.1 | .5 | 1.6 |
| | Numero | 34 | 16 | 50 |
| 10.00 | Porcentaje | 1.3 | .9 | 2.2 |
| | Numero | 41 | 27 | 68 |
| 11.00 | Porcentaje | 1.2 | .7 | 1.9 |
| | Numero | 37 | 22 | 59 |
| 12.00 | Porcentaje | 1.3 | .7 | 2.0 |
| | Numero | 40 | 22 | 62 |
| 13.00 | Porcentaje | 1.0 | .8 | 1.8 |
| | Numero | 31 | 26 | 56 |
| 14.00 | Porcentaje | .8 | .8 | 1.6 |
| | Numero | 26 | 26 | 52 |
| 15.00 | Porcentaje | 1.1 | .8 | 1.9 |
| | Numero | 35 | 25 | 61 |
| 16.00 | Porcentaje | 1.1 | .6 | 1.7 |
| | Numero | 34 | 18 | 52 |
| 17.00 | Porcentaje | 1.0 | .6 | 1.7 |
| | Numero | 33 | 20 | 53 |
| 18.00 | Porcentaje | 1.7 | .6 | 2.2 |
| | Numero | 53 | 18 | 71 |
| 19.00 | Porcentaje | .5 | .3 | .8 |
| | Numero | 16 | 10 | 26 |
| 20.00 | Porcentaje | 1.1 | .5 | 1.7 |
| | Numero | 36 | 17 | 53 |
| 21.00 | Porcentaje | 1.0 | .6 | 1.6 |
| | Numero | 30 | 19 | 50 |
| 22.00 | Porcentaje | .8 | .6 | 1.4 |
| | Numero | 25 | 20 | 46 |
| 23.00 | Porcentaje | 1.3 | .6 | 1.9 |
| | Numero | 42 | 19 | 61 |
| 24.00 | Porcentaje | 1.2 | .9 | 2.1 |
| | Numero | 37 | 28 | 65 |
| 25.00 | Porcentaje | 1.1 | .8 | 1.9 |
| | Numero | 34 | 25 | 59 |
| 26.00 | Porcentaje | .9 | .7 | 1.6 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----|----|-----|
| | | Numero | 27 | 22 | 50 |
| 27.00 | | Porcentaje | .8 | .6 | 1.5 |
| | | Numero | 26 | 20 | 46 |
| 28.00 | | Porcentaje | 1.4 | .5 | 1.8 |
| | | Numero | 43 | 14 | 58 |
| 29.00 | | Porcentaje | 1.1 | .7 | 1.8 |
| | | Numero | 36 | 21 | 57 |
| 30.00 | | Porcentaje | 1.0 | .7 | 1.7 |
| | | Numero | 32 | 22 | 54 |
| 31.00 | | Porcentaje | 1.1 | .4 | 1.5 |
| | | Numero | 33 | 13 | 46 |
| 32.00 | | Porcentaje | .7 | .6 | 1.3 |
| | | Numero | 21 | 20 | 41 |
| 33.00 | | Porcentaje | 1.1 | .6 | 1.8 |
| | | Numero | 35 | 20 | 55 |
| 34.00 | | Porcentaje | .9 | .7 | 1.6 |
| | | Numero | 30 | 21 | 51 |
| 35.00 | | Porcentaje | 1.0 | .5 | 1.5 |
| | | Numero | 33 | 16 | 48 |
| 36.00 | | Porcentaje | .6 | .6 | 1.2 |
| | | Numero | 19 | 20 | 39 |
| 37.00 | | Porcentaje | 1.1 | .6 | 1.7 |
| | | Numero | 35 | 17 | 53 |
| 38.00 | | Porcentaje | 1.2 | .6 | 1.8 |
| | | Numero | 37 | 19 | 55 |
| 39.00 | | Porcentaje | .7 | .8 | 1.5 |
| | | Numero | 22 | 24 | 46 |
| 40.00 | | Porcentaje | 1.1 | .5 | 1.6 |
| | | Numero | 34 | 17 | 51 |
| 41.00 | | Porcentaje | 1.0 | .7 | 1.7 |
| | | Numero | 30 | 24 | 54 |
| 42.00 | | Porcentaje | .8 | .7 | 1.5 |
| | | Numero | 25 | 21 | 46 |
| 43.00 | | Porcentaje | .9 | .6 | 1.4 |
| | | Numero | 27 | 19 | 46 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|------|------|------|
| 44.00 | Porcentaje | 1.0 | .3 | 1.3 | |
| | Numero | 30 | 9 | 39 | |
| 45.00 | Porcentaje | .8 | .5 | 1.3 | |
| | Numero | 25 | 17 | 42 | |
| 46.00 | Porcentaje | .8 | .9 | 1.7 | |
| | Numero | 25 | 30 | 55 | |
| 47.00 | Porcentaje | .7 | .7 | 1.4 | |
| | Numero | 23 | 22 | 46 | |
| 48.00 | Porcentaje | .9 | .8 | 1.7 | |
| | Numero | 29 | 26 | 55 | |
| 49.00 | Porcentaje | 1.0 | .4 | 1.4 | |
| | Numero | 30 | 14 | 44 | |
| 50.00 | Porcentaje | 1.1 | .8 | 1.9 | |
| | Numero | 35 | 25 | 60 | |
| 51.00 | Porcentaje | .8 | .7 | 1.5 | |
| | Numero | 27 | 22 | 48 | |
| 52.00 | Porcentaje | 1.0 | .8 | 1.8 | |
| | Numero | 32 | 25 | 57 | |
| 53.00 | Porcentaje | .7 | .3 | 1.0 | |
| | Numero | 21 | 10 | 31 | |
| 54.00 | Porcentaje | 1.1 | .6 | 1.7 | |
| | Numero | 35 | 18 | 52 | |
| 55.00 | Porcentaje | 1.2 | .8 | 1.9 | |
| | Numero | 37 | 24 | 62 | |
| 56.00 | Porcentaje | 1.0 | .7 | 1.7 | |
| | Numero | 33 | 22 | 55 | |
| 57.00 | Porcentaje | .6 | .7 | 1.2 | |
| | Numero | 18 | 21 | 39 | |
| 58.00 | Porcentaje | 1.2 | .6 | 1.8 | |
| | Numero | 39 | 18 | 57 | |
| 59.00 | Porcentaje | 1.4 | 1.1 | 2.5 | |
| | Numero | 44 | 33 | 77 | |
| Nivel educativo de la madre | Sin instruccion | Porcentaje | 1.6 | 7.7 | 9.4 |
| | | Numero | 51 | 244 | 295 |
| | Primaria | Porcentaje | 23.6 | 27.4 | 51.0 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|------|------|-------|
| | | Numero | 744 | 864 | 1608 |
| | Secundaria y mas | Porcentaje | 34.9 | 3.5 | 38.4 |
| | | Numero | 1101 | 110 | 1211 |
| | Otro | Porcentaje | 1.1 | .2 | 1.2 |
| | | Numero | 34 | 5 | 39 |
| | Missing/DK | Porcentaje | .1 | .0 | .1 |
| | | Numero | 2 | 0 | 2 |
| Total | Porcentaje | | 61.2 | 38.8 | 100.0 |
| | Numero | | 1932 | 1223 | 3155 |

Cuadro 7: Número promedio de hijos nacidos vivos (HN) y proporción que ha fallecido, por edad de la madre, Bolivia, 2000

| | | Numero promedio de HN | Proporcion que Ha fallecido | Numero de mujeres |
|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Edad | 15-19 | .223 | .036 | 920 |
| | 20-24 | 1.111 | .067 | 891 |
| | 25-29 | 2.064 | .077 | 759 |
| | 30-34 | 3.350 | .083 | 629 |
| | 35-39 | 4.095 | .112 | 556 |
| | 40-44 | 5.009 | .138 | 429 |
| | 45-49 | 5.354 | .144 | 350 |
| TOTAL1 | Total | 2.463 | .107 | 4533 |

Cuadro 7 (A): Número total de niños fallecidos por sexo y edad de la madre, Bolivia, 2000

| | | Numero total de ninos fallecidos | Numero total de ninas fallecidos | Sex ratio at birth |
|------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Edad de la madre | 15-19 | 120 | 85 | 1.42 |
| | 20-24 | 507 | 484 | 1.05 |
| | 25-29 | 786 | 781 | 1.01 |
| | 30-34 | 1027 | 1081 | .95 |
| | 35-39 | 1168 | 1107 | 1.06 |
| | 40-44 | 1107 | 1041 | 1.06 |
| | 45-49 | 972 | 899 | 1.08 |

Cuadro 9: Porcentaje de niños de 36 a 59 meses que atienden alguna forma de programa organizado de educación en la primera infancia, Bolivia, 2000

| | | Atienden algun programa | Numero de ninos |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Sexo | Hombres | 16.6 | 597 |
| | Mujeres | 17.9 | 611 |
| Región | Altiplano | 14.3 | 508 |
| | Valle | 21.9 | 420 |
| | Llano | 15.8 | 280 |
| Area | Urbana | 18.2 | 712 |
| | Rural | 15.9 | 497 |
| Edad | 36-47 meses | 7.7 | 572 |
| | 48-59 meses | 25.8 | 636 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instruccion | 14.6 | 131 |
| | Primaria | 12.7 | 634 |
| | Secundaria y más | 24.1 | 424 |
| | Otro | 35.0 | 19 |
| | Missing/DK | .0 | 0 |
| Total | | 17.3 | 1208 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 26</i> | | | |

Cuadro 10: Porcentaje de niños que asisten al primer grado de escuela primaria y que alcanzan el grado 5°, Bolivia, MICS 2000

| | | <i>Porcentaje que asisten al 2º, que estaban en 1º el año pasado</i> | <i>Porcentaje que asisten al 3º, que estaban en 2º el año pasado</i> | <i>Porcentaje que asisten al 4º, que estaban en 3º el año pasado</i> | <i>Porcentaje que asisten al 5º, que estaban en 4º el año pasado</i> | <i>Porcentaje que llegan al 5º en cuatro años a partir del 1º.</i> |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Sexo | Hombres | 94.7 | 97.5 | 97.2 | 96.9 | 86.9 |
| | Mujeres | 96.3 | 96.3 | 96.8 | 99.2 | 89.0 |
| Region | Altiplano | 96.5 | 97.6 | 96.9 | 97.7 | 89.2 |
| | Valle | 95.3 | 97.0 | 97.9 | 98.1 | 88.8 |
| | Llano | 94.9 | 96.4 | 96.2 | 98.3 | 86.5 |
| Area | Urbana | 95.7 | 96.2 | 97.6 | 97.7 | 87.8 |
| | Rural | 95.3 | 98.0 | 96.7 | 98.8 | 89.0 |
| TOTAL | 1.00 | 95.5 | 97.1 | 97.0 | 98.0 | 88.1 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 6

El porcentaje de niños que llegan al 5° en cuatro años partiendo del primer grado se calculó como el producto de cuatro probabilidades:

- La probabilidad de que un niño se gradúe del primer grado e ingrese al segundo grado en el transcurso de un año;
- La probabilidad de que un niño se gradúe del segundo grado e ingrese al tercer grado en el transcurso de un año;
- La probabilidad de que un niño se gradúe del tercer grado e ingrese al cuarto grado en el transcurso de un año;
- La probabilidad de que un niño se gradúe del cuarto grado e ingrese al quinto grado en el transcurso de un año;

Cuadro 11: Porcentaje de niños en edad escolar primaria (6 a 15 años) que asisten a la escuela primaria (de 1° a 8° grado), Bolivia, 2000

| | | Sexo | | | | Total | |
|--|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | Hombres | | Mujeres | | Asisten | Numero |
| | | Asisten | Numero | Asisten | Número | | |
| Edad | 6 | 69.6 | 279 | 66.6 | 287 | 68.0 | 566 |
| | 7 | 94.7 | 243 | 94.3 | 243 | 94.5 | 487 |
| | 8 | 97.1 | 271 | 96.7 | 294 | 96.9 | 566 |
| | 9 | 99.5 | 219 | 97.6 | 208 | 98.6 | 427 |
| | 10 | 99.3 | 254 | 97.2 | 277 | 98.2 | 531 |
| | 11 | 98.6 | 229 | 97.2 | 185 | 98.0 | 414 |
| | 12 | 94.1 | 209 | 92.1 | 256 | 93.0 | 466 |
| | 13 | 87.9 | 224 | 83.9 | 229 | 85.9 | 453 |
| | 14 | 55.4 | 230 | 51.0 | 201 | 53.3 | 431 |
| | 15 | 23.3 | 171 | 22.2 | 205 | 22.7 | 376 |
| Total | | 83.5 | 2331 | 81.1 | 2386 | 82.2 | 4716 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 6</i> | | | | | | | |

Cuadro 12: Porcentaje de la población 15 y más años que es alfabeta, Bolivia, 2000

| | | Sexo | | | | | | Total | | |
|--|-------------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | | Hombres | | | Mujeres | | | Alfabeta | No se sabe | Número |
| | | Alfabeta | No se sabe | Numero | Alfabeta | No se sabe | Numero | | | |
| Numero de linea de la madre o cuidadora en el módulo de salud infantil | No elegible | 94.8 | 1.4 | 5192 | 83.9 | 3.8 | 5789 | 89.1 | 2.7 | 10981 |
| Numero de linea de la madre o cuidadora en el módulo de trabajo infantil | No elegible | 94.8 | 1.4 | 5192 | 83.9 | 3.8 | 5789 | 89.1 | 2.7 | 10981 |
| Edad | 15-24 | 99.6 | .2 | 1601 | 97.1 | .4 | 1875 | 98.3 | .3 | 3476 |
| | 25-34 | 98.6 | .4 | 1243 | 94.2 | 1.1 | 1396 | 96.3 | .8 | 2639 |
| | 35-44 | 97.3 | 1.0 | 952 | 84.1 | 3.7 | 1011 | 90.5 | 2.4 | 1963 |
| | 45-54 | 92.9 | 1.9 | 682 | 73.3 | 7.7 | 705 | 82.9 | 4.9 | 1387 |
| | 55-64 | 82.5 | 5.1 | 381 | 49.5 | 10.6 | 398 | 65.6 | 7.9 | 779 |
| | 65+ | 69.1 | 7.0 | 333 | 38.5 | 16.1 | 403 | 52.4 | 12.0 | 736 |
| Total | | 94.8 | 1.4 | 5192 | 83.9 | 3.8 | 5789 | 89.1 | 2.7 | 10981 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 7</i> | | | | | | | | | | |

Cuadro 13: Distribución porcentual de la población por fuente de agua potable y porcentaje de la población con acceso a fuente de agua potable segura, por características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | Fuente principal de agua potable | | | | | | | | | | | Total | Total con agua potable segura | No de personas |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|-------|-------------------------------|----------------|
| | | Tubería dentro la vivienda | Tubería en el patio | Llave pública | Pozo con tubería o bomba | Pozo protegido o cubierto | Manantial protegido | Pozo no protegido | Manantial no protegido | Charca, estanque, río o arroyo | Camión o tanque vendedor | Otro | | | |
| Región | Altiplano | 28.5 | 48.4 | 4.0 | 2.3 | 3.3 | .1 | 5.0 | 1.3 | 4.1 | .4 | 2.6 | 100.0 | 85.3 | 1974 |
| | Valle | 41.2 | 32.4 | 3.7 | 1.6 | 2.3 | .4 | .9 | 1.8 | 5.7 | 3.4 | 6.5 | 100.0 | 80.0 | 1326 |
| | Llano | 32.1 | 52.5 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | .4 | 2.0 | .5 | .3 | .1 | 5.0 | 100.0 | 90.2 | 1078 |
| Area | Urbana | 44.5 | 46.6 | 1.4 | .7 | 1.5 | .1 | .8 | .1 | .1 | 1.8 | 2.7 | 100.0 | 92.8 | 2894 |
| | Rural | 11.3 | 40.7 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | .6 | 7.5 | 3.6 | 10.7 | .1 | 7.6 | 100.0 | 69.5 | 1483 |
| Total | | 33.2 | 44.6 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | .2 | 3.0 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 4.4 | 100.0 | 84.9 | 4377 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 4</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

Cuadro 14: Distribución porcentual de la población por tipo de servicio sanitario y porcentaje de la población con acceso a medios sanitarios de eliminación de excretas, por características seleccionadas, Bolivia, 2000

| | | Sanitario con sistema de alcantarillado o pozo séptico | Letrina con agua fluida | Letrina mejorada o ecológica | Letrina tradicional | Bacín | No tiene sanitario, o matorral o campo | Otro | Total | Total con medio sanitario de eliminación de excretas | No de personas |
|--------------|-----------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------|--|------|-------|--|----------------|
| Región | Altiplano | 48.7 | 4.2 | .2 | 12.6 | .6 | 29.6 | 4.1 | 100.0 | 65.8 | 8327 |
| | Valle | 48.7 | .2 | .5 | 16.6 | .0 | 30.9 | 3.0 | 100.0 | 66.0 | 5865 |
| | Llano | 44.7 | 11.0 | 8.9 | 31.0 | .0 | 1.8 | 2.5 | 100.0 | 95.7 | 4895 |
| Area | Urbana | 68.8 | 6.7 | 2.9 | 11.7 | .4 | 6.7 | 2.8 | 100.0 | 90.1 | 12363 |
| | Rural | 8.9 | 1.0 | 1.9 | 31.2 | .0 | 52.6 | 4.3 | 100.0 | 43.0 | 6724 |
| Total | | 47.7 | 4.7 | 2.6 | 18.6 | .3 | 22.9 | 3.4 | 100.0 | 73.5 | 19087 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 5

Cuadro 16: Porcentaje de niños vivos por situación de lactancia, Bolivia, 2000.

| | | Lactancia exclusiva | | Complementary feeding rate | | Continued breastfeeding rate | | Continued breastfeeding rate | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | Niños de 0-3 meses | Número de niños | Niños de 6-9 meses | Número de niños | Niños de 12-15 meses | Número de niños | Niños de 20-23 meses | Número de niños |
| Sexo | Hombres | 48.7 | 104 | 73.6 | 98 | 74.0 | 119 | 35.5 | 108 |
| | Mujeres | 44.0 | 119 | 77.9 | 101 | 79.5 | 113 | 36.7 | 101 |
| Región | Altiplano | 55.2 | 92 | 82.5 | 73 | 82.6 | 103 | 50.7 | 92 |
| | Valle | 53.0 | 84 | 83.3 | 69 | 76.7 | 93 | 26.6 | 72 |
| | Llano | 17.0 | 48 | 58.3 | 58 | 59.1 | 34 | 21.4 | 45 |
| Area | Urbana | 33.6 | 138 | 77.2 | 130 | 75.2 | 132 | 34.9 | 133 |
| | Rural | 66.4 | 86 | 73.2 | 70 | 78.7 | 99 | 38.2 | 76 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 80.0 | 23 | 86.9 | 10 | 87.7 | 13 | 45.0 | 13 |
| | Primaria | 50.5 | 105 | 72.1 | 107 | 77.1 | 122 | 37.6 | 105 |
| | Secundaria y más | 33.5 | 92 | 77.9 | 78 | 75.9 | 94 | 33.3 | 90 |
| | Otro | 31.5 | 4 | 100.0 | 3 | 29.2 | 2 | .0 | 1 |
| | Missing/DK | . | 0 | 100.0 | 2 | . | 0 | . | 0 |
| Total | | 46.2 | 224 | 75.8 | 200 | 76.7 | 231 | 36.1 | 209 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 16

Cuadro 16(A) : Porcentaje de niños por situación de lactancia, Bolivia, 2000.

| | | Breastfeeding status | | | | | Total | |
|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| | | No están lactando | Lactancia exclusiva | Leche materna y agua solamente | Leche materna y líquidos solamente | Leche materna y alimentos sólidos | Total | Número de niños |
| Age | 0-1 | 2.2 | 56.0 | 6.6 | 35.1 | .1 | 100.0 | 85 |
| | 2-3 | 3.2 | 40.8 | 7.4 | 44.3 | 4.4 | 100.0 | 137 |
| | 4-5 | 4.0 | 25.5 | 5.4 | 24.5 | 40.7 | 100.0 | 121 |
| | 6-7 | 12.4 | 5.2 | .0 | 11.4 | 71.0 | 100.0 | 96 |
| | 8-9 | 8.3 | 1.3 | .8 | 7.0 | 82.5 | 100.0 | 100 |
| | 10-11 | 10.2 | .9 | 1.3 | 6.8 | 80.8 | 100.0 | 126 |
| | 12-13 | 16.6 | .3 | .0 | 4.4 | 78.7 | 100.0 | 115 |
| | 14-15 | 27.2 | 1.0 | .0 | 6.6 | 65.1 | 100.0 | 112 |
| | 16-17 | 26.2 | .0 | .0 | 5.9 | 67.9 | 100.0 | 100 |
| | 18-19 | 55.8 | .0 | .0 | .9 | 43.3 | 100.0 | 93 |
| | 20-21 | 58.1 | .0 | .0 | 1.7 | 40.2 | 100.0 | 99 |
| | 22-23 | 67.5 | .0 | .0 | 1.1 | 31.4 | 100.0 | 105 |
| | 24-25 | 81.0 | .0 | .0 | .3 | 18.7 | 100.0 | 122 |
| | 26-27 | 90.2 | .0 | .0 | .0 | 9.8 | 100.0 | 95 |
| | 28-29 | 89.5 | .0 | .0 | .0 | 10.5 | 100.0 | 111 |
| | 30-31 | 95.5 | .0 | .0 | .0 | 4.5 | 100.0 | 100 |
| 32-33 | 93.2 | .0 | .0 | 1.6 | 5.2 | 100.0 | 91 | |
| 34-35 | 99.5 | .0 | .0 | .0 | .5 | 100.0 | 99 | |

Lactancia exclusiva incluye vitaminas y minerales suplementarios y otras medicinas.

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 16

Cuadro 17: Porcentaje de hogares que consumen sal adecuadamente yodada, Bolivia, 2000.

| | | Porcentaje de hogares sin sal | Porcentaje de hogares donde la sal fue testeada | Resultado del test | | Número de hogares entrevistados |
|--------------|-----------|-------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | < 15 PPM | 15+ PPM | Total |
| Región | Altiplano | 2.2 | 94.9 | 36.5 | 63.5 | 1941 |
| | Valle | 1.1 | 97.8 | 45.1 | 54.9 | 1300 |
| | Llano | 3.7 | 95.0 | 18.4 | 81.6 | 1057 |
| Área | Urbana | 2.6 | 95.8 | 30.1 | 69.9 | 2838 |
| | Rural | 1.5 | 95.9 | 43.9 | 56.1 | 1460 |
| Total | | 2.2 | 95.8 | 34.8 | 65.2 | 4298 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 14

Sal adecuadamente yodada se define como sal que contiene por lo menos 15 partes por millón de yodo.

La información sobre yodación de la sal proviene del cuestionario de hogar (YS1). El porcentaje de hogares con sal yodada se calcula dividiendo el número de hogares con sal adecuadamente yodada (YS1 = 3) por el número de hogares en los cuales se hizo la prueba de la sal (YS1 = 1, 2, 3).

Cuadro 18: Distribución porcentual de niños 6-59 meses según si han recibido una dosis alta de suplemento de Vitamina A en los últimos 6 meses, Bolivia, 2000.

| | | Recibió: en los últimos 6 meses | Recibió: antes de los últimos 6 meses | Recibió: no está segura cuándo | No está segura si recibió | No recibió | Total | Número de niños |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|
| Sexo | Hombres | 34.9 | 18.6 | 2.7 | 1.1 | 42.6 | 100.0 | 1409 |
| | Mujeres | 34.2 | 16.2 | 3.8 | 1.6 | 44.2 | 100.0 | 1398 |
| Región | Altiplano | 35.7 | 15.0 | 4.5 | 1.0 | 43.8 | 100.0 | 1167 |
| | Valle | 34.3 | 19.2 | 1.8 | 2.0 | 42.7 | 100.0 | 1016 |
| | Llano | 32.8 | 19.1 | 3.5 | .9 | 43.7 | 100.0 | 625 |
| Area | Urbana | 33.7 | 18.3 | 3.8 | 1.3 | 42.8 | 100.0 | 1708 |
| | Rural | 35.8 | 16.0 | 2.5 | 1.3 | 44.4 | 100.0 | 1100 |
| Edad | 6-11 meses | 28.7 | 3.5 | .2 | .4 | 67.2 | 100.0 | 327 |
| | 12-23 meses | 38.8 | 10.2 | 2.8 | 1.3 | 46.9 | 100.0 | 642 |
| | 24-35 meses | 37.4 | 17.9 | 2.6 | 1.3 | 40.8 | 100.0 | 630 |
| | 36-47 meses | 31.9 | 23.6 | 3.8 | 1.3 | 39.4 | 100.0 | 572 |
| | 48-59 meses | 32.8 | 25.7 | 5.6 | 2.0 | 33.8 | 100.0 | 636 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 28.5 | 11.0 | 3.9 | 2.9 | 53.6 | 100.0 | 262 |
| | Primaria | 34.0 | 17.4 | 3.0 | 1.3 | 44.3 | 100.0 | 1455 |
| | Secundaria y más | 36.6 | 19.0 | 3.6 | 1.0 | 39.8 | 100.0 | 1057 |
| | Otro | 35.5 | 21.6 | .0 | .0 | 42.8 | 100.0 | 33 |
| Total | | 34.5 | 17.4 | 3.3 | 1.3 | 43.4 | 100.0 | 2808 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 15

Cuadro 19: Porcentaje de mujeres con un nacimiento en los últimos 12 meses según si recibieron una dosis alta de suplemento de Vitamina A antes que el niño tuviera 8 semanas, Bolivia, 2000.

| | | Recibió suplemento de Vitamina A | No está segura si recibió | Número de mujeres |
|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Región | Altiplano | 21.7 | .0 | 338 |
| | Valle | 10.8 | .2 | 326 |
| | Llano | 21.9 | 2.0 | 187 |
| Area | Urbana | 19.3 | .4 | 512 |
| | Rural | 15.0 | .7 | 339 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 10.2 | 2.6 | 68 |
| | Primaria | 17.3 | .1 | 425 |
| | Secundaria y más | 19.1 | .6 | 344 |
| | Otro | 26.0 | .0 | 12 |
| | Missing/DK | .0 | .0 | 2 |
| Total | | 17.6 | .5 | 851 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 15</i> | | | | |

Cuadro 20: Distribución porcentual de nacidos vivos en los últimos 12 meses según su peso y talla al nacer, por características seleccionadas, Bolivia, 2000.

| | | Peso al nacer | | | | Talla al nacer | | | | | | Total | Número |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------|------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|-----|-------|--------|
| | | <2500 | 2500+ | DK/Missing | No pesado al nacer | Muy grande | Más grande que el promedio | Promedio | Más pequeño que el promedio | Muy pequeño | DK | | |
| Región | Altiplano | 1.4 | 63.4 | 6.0 | 29.3 | 3.5 | 9.6 | 64.4 | 13.3 | 5.2 | 3.9 | 100.0 | 338 |
| | Valle | 5.1 | 63.8 | 3.8 | 27.3 | 2.2 | 17.0 | 58.5 | 14.1 | 8.0 | .2 | 100.0 | 326 |
| | Llano | 3.5 | 88.6 | 2.0 | 5.8 | 3.8 | 13.0 | 64.8 | 11.0 | 5.4 | 2.0 | 100.0 | 187 |
| Area | Urbana | 4.8 | 83.6 | 3.4 | 8.2 | 3.9 | 13.7 | 60.9 | 13.2 | 7.3 | 1.0 | 100.0 | 512 |
| | Rural | 1.0 | 47.1 | 5.5 | 46.4 | 1.7 | 12.4 | 64.2 | 13.0 | 4.9 | 3.8 | 100.0 | 339 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 3.5 | 28.4 | 7.1 | 61.0 | .7 | 2.0 | 61.2 | 17.7 | 8.9 | 9.5 | 100.0 | 68 |
| | Primaria | 2.5 | 57.3 | 5.9 | 34.3 | 1.3 | 13.9 | 64.3 | 13.2 | 5.4 | 1.9 | 100.0 | 425 |
| | Secundaria y más | 4.1 | 90.6 | 1.8 | 3.5 | 5.8 | 12.6 | 61.0 | 12.4 | 7.3 | .9 | 100.0 | 344 |
| | Otro | 5.5 | 94.5 | .0 | .0 | .0 | 55.1 | 39.4 | 5.5 | .0 | .0 | 100.0 | 12 |
| | Missing/DK | .0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 2 |
| Total | | 3.3 | 69.1 | 4.3 | 23.4 | 3.1 | 13.2 | 62.2 | 13.1 | 6.3 | 2.1 | 100.0 | 851 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 12

Cuadro 21: Porcentaje de niños de 12 a 23 meses vacunados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento y antes del primer cumpleaños, Bolivia, 2000

| | | |
|----------------|-------------------------|------|
| BCG | Con carné de vacunación | 48.9 |
| | Reporte de la madre | 43.6 |
| | No vacunado | 7.5 |
| DPT1 | Con carné de vacunación | 49.2 |
| | Reporte de la madre | 42.9 |
| | No vacunado | 7.9 |
| DPT2 | Con carné de vacunación | 45.9 |
| | Reporte de la madre | 35.6 |
| | No vacunado | 18.4 |
| DPT3 | Con carné de vacunación | 41.4 |
| | Reporte de la madre | 30.3 |
| | No vacunado | 28.3 |
| Polio 0 | Con carné de vacunación | 42.9 |
| | Reporte de la madre | 29.6 |
| | No vacunado | 27.5 |
| Polio 1 | Con carné de vacunación | 48.9 |
| | Reporte de la madre | 42.7 |
| | No vacunado | 8.4 |
| Polio 2 | Con carné de vacunación | 45.8 |
| | Reporte de la madre | 34.7 |
| | No vacunado | 19.5 |
| Polio 3 | Con carné de vacunación | 42.2 |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------|
| | Reporte de la madre | 15.1 |
| | No vacunado | 42.7 |
| Sarampión | Con carné de vacunación | 41.6 |
| | Reporte de la madre | 37.3 |
| | No vacunado | 21.1 |
| Todas las vacunas | Con carné de vacunación | 34.7 |
| | Reporte de la madre | 15.2 |
| | No recibió todas las vacunas | 50.1 |
| Ninguna vacuna | Reporte de la madre | 3.1 |
| | Ha recibido algunas vacunas | 96.9 |
| TOTAL | Número de niños | 642.2 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 22</i> | | |

Cuadro 21(A): Porcentaje de niños de 12 a 23 meses vacunados contra enfermedades de la niñez en cualquier momento y antes del primer cumpleaños, para niños que tenían la información completa en su carné de vacunación, Bolivia, 2000.

| | |
|---|------|
| BCG | 96.7 |
| DPT 1 | 95.3 |
| DPT 2 | 93.7 |
| DPT 3 | 92.2 |
| Polio 0 | 97.9 |
| Polio 1 | 95.9 |
| Polio 2 | 94.7 |
| Polio 3 | 91.4 |
| Sarampión | 74.5 |
| Todas las vacunas | 64.8 |
| Ninguna vacuna | .0 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 22</i> | |

Cuadro 22: Porcentaje de niños de 12-23 meses, vacunados en cualquier momento contra enfermedades de la niñez, Bolivia, 2000.

| | | BCG | DPT 1 | DPT 2 | DPT 3 | Polio 0 | Polio 1 | Polio 2 | Polio 3 | II. Sarampión | todas l | Ninguna | % con carné de salud | Número de niños |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|----------------------|-----------------|
| Sexo | Male | 91.8 | 91.9 | 80.5 | 71.9 | 73.0 | 90.9 | 80.5 | 54.4 | 78.2 | 47.3 | 2.8 | 52.7 | 330 |
| | Female | 93.2 | 92.5 | 82.7 | 71.5 | 71.9 | 92.3 | 80.5 | 60.3 | 79.7 | 52.5 | 3.4 | 56.3 | 312 |
| Región | Altiplano | 91.9 | 92.2 | 84.0 | 75.5 | 71.6 | 92.4 | 81.9 | 57.2 | 76.4 | 48.1 | 3.4 | 55.2 | 269 |
| | Valle | 93.6 | 93.7 | 79.8 | 66.3 | 69.8 | 91.4 | 77.6 | 55.0 | 78.4 | 48.8 | 3.7 | 49.9 | 250 |
| | Llano | 91.5 | 88.7 | 79.9 | 74.4 | 79.8 | 90.1 | 83.1 | 61.9 | 85.2 | 55.8 | 1.2 | 62.0 | 124 |
| Area | Urbana | 96.8 | 93.7 | 85.1 | 75.5 | 84.8 | 94.5 | 83.4 | 58.2 | 82.7 | 52.9 | 1.8 | 57.7 | 401 |
| | Rural | 85.2 | 89.6 | 75.6 | 65.5 | 51.9 | 86.7 | 75.6 | 55.7 | 72.6 | 44.9 | 5.3 | 49.0 | 241 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 80.2 | 84.6 | 70.2 | 63.7 | 48.1 | 83.4 | 74.6 | 47.5 | 74.9 | 38.0 | 11.8 | 40.4 | 48 |
| | Primaria | 89.4 | 90.1 | 75.1 | 62.9 | 61.5 | 88.6 | 74.5 | 53.7 | 73.9 | 44.8 | 4.0 | 51.9 | 320 |
| | Secundaria y más | 98.2 | 95.7 | 90.8 | 83.0 | 89.3 | 96.5 | 88.2 | 64.1 | 85.9 | 58.9 | .5 | 60.8 | 267 |
| | Otro | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28.4 | 67.6 | 18.9 | .0 | 28.4 | 7 |
| Total | | 92.5 | 92.1 | 81.6 | 71.7 | 72.5 | 91.6 | 80.5 | 57.3 | 78.9 | 49.9 | 3.1 | 54.4 | 642 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 22</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Cuadro 23: Distribución porcentual de niños menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas, por tipo de tratamiento y características seleccionadas, Bolivia, 2000.

| | | Tuvo diarrea en las dos últimas semanas | Número de niños menores de 5 | Lactando | Papilla | Suero casero recomendado | Paquetes de SRO | Otra leche o fórmula infantil | Agua con los alimentos | Cualquier tratamiento recomendado | Ningún tratamiento | Número de niños con diarrea 1.00 |
|------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|----------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sexo | Hombres | 22.2 | 1586 | 37.9 | 76.6 | 67.5 | 23.7 | 31.7 | 77.6 | 99.4 | .6 | 352 |
| | Mujeres | 18.6 | 1570 | 43.2 | 74.1 | 66.7 | 25.8 | 28.2 | 73.7 | 99.0 | 1.0 | 293 |
| Región | Altiplano | 17.4 | 1312 | 41.3 | 81.3 | 65.6 | 27.9 | 28.2 | 70.2 | 99.0 | 1.0 | 228 |
| | Valle | 24.3 | 1145 | 41.9 | 69.2 | 67.2 | 19.0 | 31.4 | 78.9 | 99.1 | .9 | 279 |
| | Llano | 19.8 | 698 | 35.3 | 78.6 | 69.6 | 30.7 | 30.7 | 78.8 | 100.0 | .0 | 138 |
| Area | Urbana | 18.0 | 1932 | 43.1 | 75.0 | 65.9 | 26.1 | 38.1 | 76.8 | 99.9 | .1 | 348 |
| | Rural | 24.2 | 1223 | 37.1 | 76.1 | 68.6 | 22.9 | 20.6 | 74.6 | 98.5 | 1.5 | 296 |
| Edad | < 6 meses | 15.6 | 348 | 81.7 | 28.1 | 43.8 | 10.8 | 25.6 | 17.8 | 95.6 | 4.4 | 54 |
| | 6-11 meses | 27.9 | 327 | 86.9 | 74.6 | 52.4 | 24.3 | 23.2 | 64.8 | 98.9 | 1.1 | 91 |
| | 12-23 meses | 31.7 | 642 | 59.9 | 84.5 | 71.1 | 26.5 | 37.1 | 80.0 | 100.0 | .0 | 204 |
| | 24-35 meses | 20.4 | 630 | 11.0 | 82.4 | 73.7 | 24.0 | 30.5 | 80.2 | 99.6 | .4 | 129 |
| | 36-47 meses | 15.9 | 572 | .0 | 76.3 | 75.8 | 22.4 | 26.1 | 91.7 | 98.9 | 1.1 | 91 |
| | 48-59 meses | 11.9 | 636 | .0 | 73.9 | 69.6 | 33.9 | 27.1 | 93.0 | 100.0 | .0 | 76 |
| Nivel educativo de la madre | Ninguna | 22.7 | 295 | 36.1 | 72.9 | 61.6 | 17.5 | 12.9 | 79.6 | 100.0 | .0 | 67 |
| | Primaria | 24.6 | 1608 | 38.0 | 74.1 | 68.8 | 22.2 | 29.6 | 74.1 | 98.9 | 1.1 | 395 |
| | Secundaria y | 14.9 | 1211 | 46.1 | 80.6 | 66.4 | 31.7 | 38.1 | 79.2 | 99.7 | .3 | 180 |
| | Otro | 6.0 | 39 | 100.0 | .0 | .0 | 100.0 | .0 | .0 | 100.0 | .0 | 2 |
| Total | | 20.4 | 3155 | 40.3 | 75.5 | 67.1 | 24.6 | 30.1 | 75.8 | 99.2 | .8 | 645 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 23

Cuadro 24: Distribución porcentual de menores de cinco años con diarrea en las dos últimas semanas, a quienes se les aumentó los líquidos y que continuaron siendo alimentados durante el episodio, Bolivia, 2000.

| | | Tuvo diarrea en las dos últimas semanas | Número de niños menores de 5 | Bebieron durante el episodio de diarrea | | | Total | Comieron durante el episodio de diarrea | | | Total | Recibió más líquidos y siguió comiendo | Número de niños con diarrea 1.00 |
|------------------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|------------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------|--|-------------------------------------|
| | | | | Más | Lo mismo o menos | Missing/DK | | Algo menos, lo mismo o más | Mucho, menos o nada | Missing/DK | | | |
| Sexo | Hombres | 22.2 | 1586 | 56.0 | 43.1 | .9 | 100.0 | 69.7 | 30.0 | .3 | 100.0 | 41.4 | 352 |
| | Mujeres | 18.6 | 1570 | 49.5 | 49.2 | 1.3 | 100.0 | 68.4 | 30.9 | .7 | 100.0 | 37.5 | 293 |
| Región | Altiplano | 17.4 | 1312 | 45.3 | 53.3 | 1.4 | 100.0 | 67.2 | 32.4 | .4 | 100.0 | 30.5 | 228 |
| | Valle | 24.3 | 1145 | 58.3 | 40.3 | 1.3 | 100.0 | 71.5 | 27.8 | .7 | 100.0 | 45.6 | 279 |
| | Llano | 19.8 | 698 | 55.1 | 44.9 | .0 | 100.0 | 67.5 | 32.5 | .0 | 100.0 | 42.6 | 138 |
| Area | Urbana | 18.0 | 1932 | 56.1 | 43.4 | .5 | 100.0 | 73.1 | 26.7 | .1 | 100.0 | 43.1 | 348 |
| | Rural | 24.2 | 1223 | 49.5 | 48.8 | 1.7 | 100.0 | 64.4 | 34.8 | .8 | 100.0 | 35.5 | 296 |
| Edad | < 6 meses | 15.6 | 348 | 23.8 | 71.2 | 5.0 | 100.0 | 31.1 | 67.1 | 1.7 | 100.0 | 9.8 | 54 |
| | 6-11 meses | 27.9 | 327 | 47.8 | 50.0 | 2.2 | 100.0 | 69.1 | 29.8 | 1.1 | 100.0 | 35.9 | 91 |
| | 12-23 meses | 31.7 | 642 | 49.7 | 49.9 | .4 | 100.0 | 69.6 | 30.4 | .0 | 100.0 | 35.6 | 204 |
| | 24-35 meses | 20.4 | 630 | 60.5 | 38.8 | .7 | 100.0 | 72.4 | 27.3 | .4 | 100.0 | 43.9 | 129 |
| | 36-47 meses | 15.9 | 572 | 60.9 | 38.6 | .5 | 100.0 | 77.1 | 22.5 | .5 | 100.0 | 51.3 | 91 |
| | 48-59 meses | 11.9 | 636 | 67.2 | 32.8 | .0 | 100.0 | 80.1 | 19.9 | .0 | 100.0 | 55.1 | 76 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 22.7 | 295 | 37.5 | 61.1 | 1.4 | 100.0 | 65.2 | 33.4 | 1.4 | 100.0 | 28.7 | 67 |
| | Primaria | 24.6 | 1608 | 55.5 | 43.5 | 1.0 | 100.0 | 66.7 | 32.8 | .5 | 100.0 | 41.8 | 395 |
| | Secundaria y + | 14.9 | 1211 | 52.9 | 46.1 | 1.0 | 100.0 | 76.9 | 23.1 | .0 | 100.0 | 39.4 | 180 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|------|-------|------|-----|-------|------|-------|----|-------|------|-----|
| | Otro | 6.0 | 39 | 100.0 | .0 | .0 | 100.0 | .0 | 100.0 | .0 | 100.0 | .0 | 2 |
| | Missing/DK | .0 | 2 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | . | 0 |
| Total | | 20.4 | 3155 | 53.0 | 45.9 | 1.1 | 100.0 | 69.1 | 30.4 | .4 | 100.0 | 39.6 | 645 |
| <i>Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 23</i> | | | | | | | | | | | | | |

Cuadro 25: Distribución porcentual de niños menores de cinco años con enfermedades respiratorias agudas (ERA) en las dos últimas semanas y con tratamiento por proveedores de salud, Bolivia, 2000.

| | | Tenía infección respiratoria aguda | Número de niños menores de 5 | Hospital | Centro de salud | Dispensario | Trabajador local de salud | Clínica del Estado | Médico particular | Curandero Tradicional | Otro | Cualquier proveedor apropiado | Número de niños con ERA |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| Sexo | Hombres | 11.9 | 1586 | 13.4 | 8.5 | 18.2 | 1.4 | 4.6 | 9.8 | .0 | 4.7 | 54.3 | 188 |
| | Mujeres | 10.9 | 1570 | 16.2 | 9.8 | 18.1 | .6 | 3.7 | 5.5 | .3 | 6.4 | 52.7 | 171 |
| Región | Altiplano | 7.2 | 1312 | 9.2 | 5.9 | 16.1 | 3.3 | 1.2 | .8 | .0 | 8.7 | 35.8 | 94 |
| | Valle | 12.3 | 1145 | 13.2 | 9.7 | 12.6 | .4 | 5.4 | 8.5 | .3 | 4.8 | 49.4 | 140 |
| | Llano | 17.8 | 698 | 20.7 | 10.9 | 25.9 | .0 | 5.0 | 12.1 | .0 | 4.0 | 71.5 | 125 |
| Area | Urbana | 11.1 | 1932 | 17.1 | 11.2 | 19.1 | .0 | 5.4 | 10.7 | .0 | 7.2 | 61.2 | 215 |
| | Rural | 11.8 | 1223 | 11.2 | 6.0 | 16.8 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | .3 | 3.0 | 42.1 | 144 |
| Edad | < 6 meses | 7.5 | 348 | 23.8 | 11.6 | 15.3 | .0 | 2.8 | 7.8 | .0 | 7.1 | 61.3 | 26 |
| | 6-11 meses | 12.6 | 327 | 7.0 | 5.8 | 20.7 | 2.9 | 5.5 | 7.2 | .0 | 6.9 | 48.0 | 41 |
| | 12-23 meses | 10.7 | 642 | 26.5 | 7.3 | 17.9 | 1.4 | 4.3 | 10.1 | .0 | 1.0 | 63.4 | 69 |
| | 24-35 meses | 12.2 | 630 | 17.5 | 9.3 | 22.5 | .8 | 2.2 | 11.9 | .0 | 4.6 | 61.4 | 77 |
| | 36-47 meses | 13.0 | 572 | 6.9 | 10.7 | 15.0 | 1.3 | 3.8 | 3.7 | .0 | 12.5 | 41.3 | 74 |
| | 48-59 meses | 11.3 | 636 | 9.8 | 10.2 | 16.7 | .0 | 6.2 | 5.6 | .6 | 2.2 | 48.5 | 72 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 12.1 | 295 | 20.2 | 4.3 | 19.3 | 1.6 | .0 | .0 | .0 | .0 | 45.5 | 36 |
| | Primaria | 12.4 | 1608 | 12.5 | 6.9 | 18.2 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | .0 | 4.9 | 45.5 | 200 |
| | Secundaria y + | 10.1 | 1211 | 16.9 | 14.2 | 16.9 | .0 | 7.5 | 14.9 | .4 | 8.2 | 68.4 | 123 |
| | Otro | 3.0 | 39 | .0 | .0 | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|
| | Missing/DK | .0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
| Total | | 11.4 | 3155 | 14.8 | 9.1 | 18.2 | 1.0 | 4.2 | 7.8 | .1 | 5.5 | 53.5 | 359 |

Cuadro 26: Distribución porcentual de niños de 0 a 59 meses que estuvieron enfermos en las dos últimas semanas por tipo de tratamiento alimentario que recibieron, Bolivia, 2000.

| | | Enfermos en las dos últimas semanas | Número de niños menores de 5 | Bebieron durante la enfermedad | | | Total | Comieron durante la enfermedad | | | Total | Tomaron más líquidos y continuaron comiendo | Número de niños enfermos |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|---|--------------------------|
| | | | | Más | Lo mismo o menos | Missing /DK | | Algo menos, lo mismo o más | Mucho menos o nada | Missing /DK | | | 1.00 |
| Sexo | Hombres | 50.1 | 1586 | 24.8 | 19.1 | 56.0 | 100.0 | 30.9 | 13.3 | 55.8 | 100.0 | 18.4 | 794 |
| | Mujeres | 45.7 | 1570 | 20.2 | 20.1 | 59.8 | 100.0 | 27.9 | 12.6 | 59.5 | 100.0 | 15.3 | 718 |
| Región | Altiplano | 41.0 | 1312 | 19.2 | 22.6 | 58.2 | 100.0 | 28.5 | 13.7 | 57.8 | 100.0 | 12.9 | 538 |
| | Valle | 53.0 | 1145 | 26.8 | 18.5 | 54.7 | 100.0 | 32.9 | 12.8 | 54.4 | 100.0 | 21.0 | 607 |
| | Llano | 52.7 | 698 | 20.7 | 16.9 | 62.4 | 100.0 | 25.4 | 12.2 | 62.4 | 100.0 | 16.0 | 368 |
| Area | Urbana | 48.8 | 1932 | 20.7 | 16.1 | 63.2 | 100.0 | 27.0 | 9.9 | 63.1 | 100.0 | 16.0 | 942 |
| | Rural | 46.6 | 1223 | 25.7 | 25.4 | 48.9 | 100.0 | 33.5 | 18.1 | 48.4 | 100.0 | 18.5 | 570 |
| Edad | < 6 meses | 38.0 | 348 | 9.8 | 29.3 | 60.9 | 100.0 | 12.8 | 27.6 | 59.6 | 100.0 | 4.0 | 132 |
| | 6-11 meses | 53.0 | 327 | 25.2 | 26.4 | 48.4 | 100.0 | 36.4 | 15.7 | 47.9 | 100.0 | 19.0 | 173 |
| | 12-23 meses | 56.2 | 642 | 28.0 | 28.1 | 43.9 | 100.0 | 39.3 | 17.1 | 43.6 | 100.0 | 20.1 | 361 |
| | 24-35 meses | 50.1 | 630 | 24.7 | 15.8 | 59.5 | 100.0 | 29.5 | 11.1 | 59.4 | 100.0 | 17.9 | 316 |
| | 36-47 meses | 44.9 | 572 | 21.6 | 13.7 | 64.8 | 100.0 | 27.3 | 7.9 | 64.8 | 100.0 | 18.1 | 257 |
| | 48-59 meses | 42.9 | 636 | 18.6 | 9.1 | 72.3 | 100.0 | 22.2 | 5.5 | 72.3 | 100.0 | 15.3 | 273 |
| Nivel educativo | Sin instrucción | 44.9 | 295 | 18.9 | 30.9 | 50.2 | 100.0 | 32.9 | 16.9 | 50.2 | 100.0 | 14.5 | 133 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| educativo de la madre | Primaria | 49.6 | 1608 | 27.5 | 21.5 | 51.0 | 100.0 | 33.0 | 16.3 | 50.7 | 100.0 | 20.7 | 798 |
| | Secundaria y + | 47.0 | 1211 | 16.8 | 14.6 | 68.7 | 100.0 | 24.3 | 7.3 | 68.3 | 100.0 | 12.5 | 570 |
| | Otro | 29.7 | 39 | 20.2 | .0 | 79.8 | 100.0 | .0 | 20.2 | 79.8 | 100.0 | .0 | 12 |
| | Missing/DK | 19.7 | 2 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | .0 | 0 |
| Total | | 47.9 | 3155 | 22.6 | 19.6 | 57.8 | 100.0 | 29.5 | 13.0 | 57.5 | 100.0 | 16.9 | 1512 |
| <i>Indicador para monitorear el Manejo Integrado de las Enfermedades en la Niñez (MIEN).</i> | | | | | | | | | | | | | |

Cuadro 27: Distribución porcentual de madres/cuidadoras de niños de 0 a 59 meses que conocen por lo menos dos síntomas para buscar atención inmediatamente, Bolivia, 2000.

| | | No es capaz de beber ni lactar | Se pone más enfermo | Aparece con fiebre | Tiene respiración agitada | Tiene dificultad para respirar | Tiene sangre en las deposiciones | Tiene dificultad para beber | Conoce por lo menos dos síntomas * | Número de madres o cuidadoras |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Región | Altiplano | 1.1 | 23.8 | 56.5 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | .5 | 13.1 | 1312 |
| | Valle | 1.0 | 14.2 | 64.7 | .6 | 3.0 | 4.2 | .8 | 13.2 | 1145 |
| | Llano | .3 | 10.3 | 57.0 | 1.5 | 2.9 | .2 | .1 | 2.7 | 698 |
| Area | Urbana | .9 | 15.1 | 65.4 | 1.2 | 3.7 | 3.7 | .3 | 11.1 | 1932 |
| | Rural | .9 | 20.8 | 50.3 | .8 | 1.9 | 2.9 | .7 | 10.3 | 1223 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 1.5 | 30.7 | 49.3 | .6 | 1.2 | 2.0 | .4 | 12.7 | 295 |
| | Primaria | .8 | 18.9 | 55.3 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | .5 | 10.6 | 1608 |
| | Secundaria y + | .8 | 12.4 | 67.0 | .8 | 4.1 | 3.3 | .5 | 10.3 | 1211 |
| | Otro | 4.2 | 5.7 | 84.2 | 1.8 | 13.2 | 7.0 | .0 | 21.5 | 39 |
| | Missing/DK | .0 | .0 | 19.7 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 2 |
| Total | | .9 | 17.3 | 59.6 | 1.0 | 3.0 | 3.4 | .5 | 10.8 | 3155 |

* Indicador para monitorear el Manejo Integrado de las Enfermedades en la Niñez (MIEN).

Cuadro 30: Distribución porcentual de mujeres de 15.49 años por conocimiento de las principales formas de prevención de la transmisión del VIH, Bolivia, 2000.

| | | Ha oído hablar del SIDA | Teniendo sólo un compañero sexual no infectado | Utilizando condón cada vez | Abstinencia sexual | Conoce las tres formas * | Conoce por lo menos una forma | No conoce ninguna forma | Número de mujeres | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | | | | 1.00 |
| Región | Altiplano | 68.7 | 55.9 | 49.1 | 44.1 | 36.4 | 59.0 | 41.0 | 2030 | |
| | Valle | 75.1 | 59.1 | 50.4 | 44.0 | 36.8 | 62.1 | 37.9 | 1312 | |
| | Llano | 88.8 | 66.7 | 64.3 | 52.5 | 41.1 | 76.3 | 23.7 | 1192 | |
| Area | Urbana | 90.9 | 74.1 | 67.8 | 58.3 | 47.7 | 80.4 | 19.6 | 3239 | |
| | Rural | 38.1 | 23.5 | 17.6 | 16.2 | 12.9 | 24.4 | 75.6 | 1294 | |
| Edad | 15-19 | 76.4 | 60.9 | 54.0 | 50.1 | 40.4 | 65.6 | 34.4 | 920 | |
| | 20-24 | 79.7 | 64.3 | 58.9 | 49.9 | 41.6 | 69.2 | 30.8 | 891 | |
| | 25-29 | 79.5 | 63.5 | 56.0 | 48.1 | 40.1 | 67.7 | 32.3 | 759 | |
| | 30-34 | 79.9 | 64.2 | 58.0 | 48.7 | 40.4 | 68.8 | 31.2 | 629 | |
| | 35-39 | 71.6 | 53.8 | 49.8 | 43.5 | 35.1 | 59.6 | 40.4 | 556 | |
| | 40-44 | 68.2 | 49.2 | 42.8 | 36.0 | 27.2 | 54.5 | 45.5 | 429 | |
| | 45-49 | 65.4 | 50.3 | 43.4 | 35.4 | 28.5 | 54.3 | 45.7 | 350 | |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 23.9 | 13.4 | 7.5 | 8.2 | 5.2 | 13.4 | 86.6 | 305 | |
| | Primaria | 60.2 | 38.5 | 33.0 | 30.3 | 22.5 | 43.0 | 57.0 | 1889 | |
| | Secundaria y + | 95.3 | 82.8 | 75.9 | 64.3 | 54.2 | 88.6 | 11.4 | 2246 | |
| | Otro | 98.9 | 89.5 | 82.9 | 64.6 | 60.7 | 91.5 | 8.5 | 84 | |
| | Missing/DK | 56.5 | 23.2 | 36.1 | 23.2 | 23.2 | 36.1 | 63.9 | 9 | |
| Total | | 75.9 | 59.7 | 53.5 | 46.3 | 37.8 | 64.4 | 35.6 | 4533 | |

Cuadro 31: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años que identifican correctamente ideas preconcebidas sobre VIH/SIDA, Bolivia, 2000.

| | | Ha oído hablar de SIDA | El SIDA puede ser transmitido por: | | Una persona que luce saludable puede estar infectada | Conoce las tres ideas preconcebidas * | Conoce por lo menos una idea preconcebida | No identifica correctamente ninguna de las ideas preconcebidas | Número de mujeres |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | Medios sobrenaturales | Picadura de mosquito | | | | | 1.00 |
| Región | Altiplano | 68.7 | 56.5 | 37.7 | 46.2 | 26.1 | 62.0 | 38.0 | 2030 |
| | Valle | 75.1 | 56.8 | 31.9 | 49.5 | 22.8 | 66.4 | 33.6 | 1312 |
| | Llano | 88.8 | 69.1 | 35.1 | 70.0 | 27.4 | 81.5 | 18.5 | 1192 |
| Área | Urbana | 90.9 | 75.6 | 45.7 | 68.0 | 33.7 | 85.1 | 14.9 | 3239 |
| | Rural | 38.1 | 20.4 | 9.4 | 17.0 | 4.8 | 26.7 | 73.3 | 1294 |
| Edad | 15-19 | 76.4 | 60.9 | 39.1 | 52.8 | 25.8 | 70.2 | 29.8 | 920 |
| | 20-24 | 79.7 | 65.6 | 39.9 | 56.3 | 29.0 | 73.2 | 26.8 | 891 |
| | 25-29 | 79.5 | 65.2 | 38.9 | 57.0 | 28.9 | 73.1 | 26.9 | 759 |
| | 30-34 | 79.9 | 63.2 | 33.8 | 60.0 | 24.8 | 73.0 | 27.0 | 629 |
| | 35-39 | 71.6 | 53.6 | 30.5 | 50.5 | 24.1 | 62.6 | 37.4 | 556 |
| | 40-44 | 68.2 | 49.9 | 27.5 | 47.0 | 21.4 | 58.9 | 41.1 | 429 |
| | 45-49 | 65.4 | 47.1 | 26.1 | 41.1 | 16.5 | 53.9 | 46.1 | 350 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 23.9 | 9.3 | 5.2 | 8.8 | 2.2 | 14.7 | 85.3 | 305 |
| | Primaria | 60.2 | 36.2 | 18.4 | 31.8 | 9.4 | 47.4 | 52.6 | 1889 |
| | Secundaria y + | 95.3 | 85.5 | 52.7 | 76.5 | 41.0 | 92.4 | 7.6 | 2246 |
| | Otro | 98.9 | 96.1 | 60.8 | 89.7 | 55.9 | 98.9 | 1.1 | 84 |
| | Missing/DK | 56.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 76.8 | 9 |
| Total | | 75.9 | 59.9 | 35.3 | 53.4 | 25.5 | 68.4 | 31.6 | 4533 |

* Indicador para monitorear VIH/SIDA.

Cuadro 32: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años que identifican correctamente formas de transmisión de VIH/SIDA de la madre al niño, Bolivia, 2000.

| | | Sabe que el SIDA se puede transmitir de la madre al hijo | Porcentaje que sabe que el SIDA se puede transmitir: | | | | | Número de mujeres |
|--------------------------------|-----------------|--|--|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Durante el embarazo | Durante el parto | Mediante la leche materna | De las tres maneras* | No sabe ninguna forma específica | 1.00 |
| Región | Altiplano | 51.9 | 48.8 | 40.9 | 34.9 | 28.2 | 49.0 | 2030 |
| | Valle | 65.1 | 60.4 | 52.6 | 41.3 | 34.9 | 36.5 | 1312 |
| | Llano | 71.1 | 67.2 | 58.9 | 46.7 | 40.5 | 30.6 | 1192 |
| Area | Urbana | 74.3 | 69.9 | 59.9 | 47.7 | 40.0 | 27.4 | 3239 |
| | Rural | 27.0 | 24.5 | 21.8 | 20.3 | 16.8 | 73.5 | 1294 |
| Edad | 15-19 | 55.1 | 51.0 | 40.4 | 35.7 | 27.8 | 46.1 | 920 |
| | 20-24 | 64.6 | 60.1 | 51.6 | 41.2 | 33.8 | 37.3 | 891 |
| | 25-29 | 70.4 | 66.6 | 55.6 | 45.1 | 36.6 | 30.7 | 759 |
| | 30-34 | 66.3 | 62.2 | 56.0 | 45.4 | 39.0 | 34.5 | 629 |
| | 35-39 | 57.9 | 55.1 | 49.0 | 38.5 | 34.1 | 43.4 | 556 |
| | 40-44 | 53.5 | 51.4 | 45.9 | 36.3 | 32.8 | 47.8 | 429 |
| | 45-49 | 48.4 | 44.2 | 42.1 | 33.1 | 29.1 | 53.3 | 350 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 14.3 | 14.0 | 12.6 | 13.1 | 11.5 | 85.7 | 305 |
| | Primaria | 45.6 | 41.1 | 37.5 | 35.6 | 29.5 | 56.1 | 1889 |
| | Secundaria y + | 78.9 | 75.3 | 63.1 | 47.0 | 39.6 | 22.4 | 2246 |
| | Otro | 88.1 | 84.7 | 68.1 | 45.7 | 34.2 | 11.9 | 84 |
| | Missing/DK | 43.6 | 24.9 | 12.1 | 30.8 | 12.1 | 56.4 | 9 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Total | 60.8 | 57.0 | 49.0 | 39.9 | 33.4 | 40.6 | 4533 |
| <i>* Indicador para monitorear VIH/SIDA</i> | | | | | | | |

Cuadro 33: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años que expresan una actitud discriminatoria hacia personas con VIH/SIDA, Bolivia, 2000.

| | | Creen que un maestro con VIH no debe seguir dando clases | No comprarían comida de una persona con VIH/SIDA | Estarían de acuerdo con por lo menos una afirmación discriminatoria * | No están de acuerdo con ninguna afirmación discriminatoria | Número de mujeres 1.00 |
|---------------|------------------|--|--|---|--|---------------------------|
| Región | Altiplano | 29.7 | 19.9 | 32.9 | 67.1 | 2030 |
| | Valle | 31.3 | 20.4 | 34.5 | 65.5 | 1312 |
| | Llano | 42.2 | 26.2 | 45.1 | 54.9 | 1192 |
| Area | Urbana | 43.8 | 28.0 | 47.5 | 52.5 | 3239 |
| | Rural | 7.5 | 6.1 | 9.1 | 90.9 | 1294 |
| Edad | 15-19 | 33.5 | 19.7 | 35.4 | 64.6 | 920 |
| | 20-24 | 39.9 | 25.0 | 43.1 | 56.9 | 891 |
| | 25-29 | 38.7 | 26.3 | 42.6 | 57.4 | 759 |
| | 30-34 | 33.2 | 24.2 | 38.1 | 61.9 | 629 |
| | 35-39 | 28.5 | 19.6 | 31.3 | 68.7 | 556 |
| | 40-44 | 24.4 | 16.5 | 26.5 | 73.5 | 429 |
| | 45-49 | 24.9 | 14.0 | 27.7 | 72.3 | 350 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 4.0 | 2.9 | 4.7 | 95.3 | 305 |
| | Primaria | 12.8 | 9.8 | 16.0 | 84.0 | 1889 |
| | Secundaria y + | 53.3 | 33.5 | 56.7 | 43.3 | 2246 |
| | Otro | 75.9 | 40.9 | 77.4 | 22.6 | 84 |
| | Missing/DK | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 68.5 | 9 |
| Total | | 33.5 | 21.7 | 36.6 | 63.4 | 4533 |
| <i>* Indicador para monitorear VIH/SIDA</i> | | | | | | |

Cuadro 34: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años que tienen un conocimiento suficiente de la transmisión de VIH/SIDA, Bolivia, 2000.

| | | Ha oído hablar de SIDA | Conoce tres formas de prevenir la transmisión de VIH | Identifica correctamente tres ideas preconcebidas sobre la transmisión de VIH | Tiene suficiente conocimiento | Número de mujeres | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | 1.00 |
| Región | Altiplano | 68.7 | 36.4 | 26.1 | 16.0 | 2030 | |
| | Valle | 75.1 | 36.8 | 22.8 | 14.6 | 1312 | |
| | Llano | 88.8 | 41.1 | 27.4 | 16.9 | 1192 | |
| Área | Urbana | 90.9 | 47.7 | 33.7 | 20.9 | 3239 | |
| | Rural | 38.1 | 12.9 | 4.8 | 3.1 | 1294 | |
| Edad | 15-19 | 76.4 | 40.4 | 25.8 | 16.8 | 920 | |
| | 20-24 | 79.7 | 41.6 | 29.0 | 17.9 | 891 | |
| | 25-29 | 79.5 | 40.1 | 28.9 | 17.0 | 759 | |
| | 30-34 | 79.9 | 40.4 | 24.8 | 16.7 | 629 | |
| | 35-39 | 71.6 | 35.1 | 24.1 | 16.2 | 556 | |
| | 40-44 | 68.2 | 27.2 | 21.4 | 11.6 | 429 | |
| | 45-49 | 65.4 | 28.5 | 16.5 | 8.8 | 350 | |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 23.9 | 5.2 | 2.2 | 1.9 | 305 | |
| | Primaria | 60.2 | 22.5 | 9.4 | 5.2 | 1889 | |
| | Secundaria y + | 95.3 | 54.2 | 41.0 | 25.8 | 2246 | |
| | Otro | 98.9 | 60.7 | 55.9 | 38.0 | 84 | |
| | Missing/DK | 56.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 9 | |
| Total | | 75.9 | 37.8 | 25.5 | 15.8 | 4533 | |

Indicador para monitorear VIH/SIDA

Cuadro 35: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años que saben donde hacerse la prueba del VIH/SIDA, y que se han hecho la prueba, Bolivia, 2000.

| | | Sabe de un sitio donde puede hacerse la prueba | Se ha hecho la prueba* | Se ha hecho la prueba y ha conocido el resultado | Número de mujeres |
|--------------------------------|-----------------|--|------------------------|--|-------------------|
| | | | | | 1.00 |
| Región | Altiplano | 23.7 | 1.6 | 77.3 | 2030 |
| | Valle | 30.9 | 3.9 | 95.3 | 1312 |
| | Llano | 41.9 | 9.1 | 89.1 | 1192 |
| Area | Urbana | 39.3 | 5.5 | 88.9 | 3239 |
| | Rural | 8.7 | 1.1 | 87.7 | 1294 |
| Edad | 15-19 | 26.7 | 1.0 | 58.9 | 920 |
| | 20-24 | 32.7 | 4.7 | 86.3 | 891 |
| | 25-29 | 36.6 | 6.7 | 96.5 | 759 |
| | 30-34 | 34.3 | 5.3 | 94.0 | 629 |
| | 35-39 | 28.6 | 4.5 | 70.5 | 556 |
| | 40-44 | 25.9 | 4.2 | 96.2 | 429 |
| | 45-49 | 24.2 | 3.8 | 100.0 | 350 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 5.0 | .6 | 21.7 | 305 |
| | Primaria | 15.4 | 2.0 | 95.6 | 1889 |
| | Secundaria y + | 45.8 | 6.5 | 87.4 | 2246 |
| | Otro | 55.8 | 5.2 | 100.0 | 84 |
| | Missing/DK | 39.0 | 18.7 | 100.0 | 9 |
| Total | | 30.6 | 4.2 | 88.8 | 4533 |

*Indicador para monitorear VIH/SIDA

Cuadro 36: Distribución porcentual de mujeres de 15-49 años en unión, que están usando (o el compañero está usando) un método anticonceptivo, Bolivia, 2000.

| | | Método en uso | | | | | | | | | | Total | Total modernos | Total tradicionales | Cualquier método | Número de mujeres |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|------|-----------|--------|------|-----------------------|--------|-------|-------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Ningún método | Esterilización femenina | Píldora | DIU | Inyección | Condón | MELA | Abstinencia periódica | Retiro | Otros | | | | | 1.00 |
| Region | Altiplano | 46.3 | 1.9 | 1.0 | 13.3 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 23.9 | 1.0 | 1.3 | 100.0 | 22.6 | 31.1 | 53.7 | 1225 |
| | Valle | 51.7 | 3.4 | 3.0 | 12.2 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 19.2 | .3 | 1.6 | 100.0 | 24.4 | 24.0 | 48.3 | 874 |
| | Llano | 40.6 | 9.9 | 9.7 | 12.1 | 4.7 | 2.9 | .8 | 19.2 | .0 | .2 | 100.0 | 39.1 | 20.2 | 59.4 | 703 |
| Area | Urbana | 40.1 | 5.2 | 4.8 | 16.4 | 3.5 | 4.6 | 2.3 | 21.7 | .5 | 1.1 | 100.0 | 34.3 | 25.6 | 59.9 | 1896 |
| | Rural | 60.1 | 2.6 | 1.9 | 4.8 | 2.6 | .7 | 5.1 | 20.4 | .7 | 1.2 | 100.0 | 12.6 | 27.3 | 39.9 | 907 |
| Edad | 15-19 | 65.5 | .7 | 2.4 | 6.6 | 1.8 | 2.4 | 5.6 | 15.0 | .0 | .1 | 100.0 | 13.8 | 20.7 | 34.5 | 141 |
| | 20-24 | 50.1 | .2 | 5.8 | 11.7 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 18.1 | .6 | .5 | 100.0 | 24.2 | 25.7 | 49.9 | 478 |
| | 25-49 | 44.6 | 5.5 | 3.5 | 13.2 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 22.3 | .6 | 1.4 | 100.0 | 28.9 | 26.6 | 55.4 | 2184 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 72.2 | 1.9 | 1.0 | 3.7 | 1.2 | .7 | 2.8 | 15.0 | .2 | 1.3 | 100.0 | 8.6 | 19.3 | 27.8 | 252 |
| | Primary | 50.4 | 4.0 | 2.5 | 7.8 | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 24.5 | .9 | 1.7 | 100.0 | 19.0 | 30.6 | 49.6 | 1327 |
| | Secondary + | 36.8 | 5.1 | 6.1 | 19.8 | 4.1 | 5.2 | 3.1 | 19.2 | .3 | .4 | 100.0 | 40.2 | 23.0 | 63.2 | 1178 |
| | Otro | 43.4 | 5.4 | .0 | 20.4 | 8.0 | 7.2 | .0 | 14.0 | .0 | 1.6 | 100.0 | 41.0 | 15.6 | 56.6 | 42 |
| | Missing/DK | 72.5 | 17.1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 10.4 | .0 | .0 | 100.0 | 17.1 | 10.4 | 27.5 | 4 |
| Total | | 46.6 | 4.3 | 3.8 | 12.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 21.3 | .5 | 1.1 | 100.0 | 27.3 | 26.1 | 53.4 | 2803 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 10

Cuadro 37: Distribución porcentual de madres con un nacimiento en los últimos 12 meses protegido contra el tétanos neonatal, Bolivia, 2000.

| | | Porcentaje de mujeres con un nacimiento en los últimos 12 meses y que además: | | | | Número de mujeres |
|--------------------------------|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | Recibieron por lo menos 2 dosis, la última en los últimos 3 años | Recibieron por lo menos 3 dosis, la última en los últimos 10 años | Recibieron por lo menos 5 dosis en toda la vida | Están protegidas contra el tétano | 1.00 |
| Región | Altiplano | 48.0 | .6 | .0 | 48.5 | 338 |
| | Valle | 53.3 | 2.8 | .0 | 56.1 | 326 |
| | Llano | 66.2 | 1.9 | .0 | 68.0 | 187 |
| Área | Urbana | 59.5 | 2.2 | .0 | 61.6 | 512 |
| | Rural | 45.7 | .9 | .0 | 46.7 | 339 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 38.1 | 1.4 | .0 | 39.5 | 68 |
| | Primaria | 49.9 | 1.0 | .0 | 50.9 | 425 |
| | Secundaria y + | 61.8 | 2.5 | .0 | 64.3 | 344 |
| | Otro | 58.3 | 5.5 | .0 | 63.8 | 12 |
| | Missing/DK | 100.0 | .0 | .0 | 100.0 | 2 |
| Total | | 54.0 | 1.7 | .0 | 55.7 | 851 |

Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 22

Cuadro 38: Distribución porcentual de madres con un nacimiento en el último año por tipo de atención prenatal, Bolivia, 2000.

| | | Personal que proporcionó la atención prenatal | | | | | | Total | Total que recibió (de cualquier personal) | Número de mujeres 1.00 |
|--------------------------------|-----------------|---|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------|---|---------------------------|
| | | Medico | Enfermera | Enfermera auxiliar | Partera tradicional * | Otros sin información | No recibió atención prenatal | | | |
| Región | Altiplano | 61.0 | 7.4 | 6.0 | 1.0 | 2.4 | 22.2 | 100.0 | 74.5 | 338 |
| | Valle | 74.8 | 4.9 | 4.2 | .4 | .0 | 15.7 | 100.0 | 83.9 | 326 |
| | Llano | 94.8 | .4 | .0 | .5 | .5 | 3.9 | 100.0 | 95.2 | 187 |
| Area | Urbana | 91.5 | .9 | .3 | .2 | .7 | 6.5 | 100.0 | 92.6 | 512 |
| | Rural | 46.8 | 11.0 | 9.7 | 1.3 | 1.7 | 29.5 | 100.0 | 67.5 | 339 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 33.8 | 7.7 | 8.2 | 1.7 | 1.9 | 46.5 | 100.0 | 49.8 | 68 |
| | Primaria | 62.5 | 7.4 | 6.1 | .7 | 1.4 | 21.8 | 100.0 | 76.0 | 425 |
| | Secundaria y + | 94.3 | 1.5 | .8 | .3 | .5 | 2.6 | 100.0 | 96.6 | 344 |
| | Otro | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 12 |
| | Missing/DK | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 2 |
| Total | | 73.7 | 4.9 | 4.0 | .6 | 1.1 | 15.7 | 100.0 | 82.6 | 851 |

* Metas de la Cumbre Mundial de la Infancia = Números 9 y 11

Cuadro 39: Distribución porcentual de madres con un nacimiento en el último año por tipo de personal que atendió el parto, Bolivia, 2000.

| | | Personal que atendió el parto | | | | | | | Total | Total que recibió de personal calificado * | Número de mujeres 1.00 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|--|---------------------------|
| | | Medico | Enfermera | Enfermera auxiliar | Partera tradicional | Familiar o amiga | Otros/sin información | No recibió atención en el parto | | | |
| Región | Altiplano | 53.9 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 36.6 | .6 | 1.1 | 100.0 | 59.1 | 338 |
| | Valle | 61.3 | 2.8 | 1.7 | 6.0 | 26.9 | .2 | 1.1 | 100.0 | 65.9 | 326 |
| | Llano | 89.2 | 1.3 | .9 | 1.7 | 6.0 | .0 | .9 | 100.0 | 91.4 | 187 |
| Area | Urbana | 86.6 | 1.7 | .2 | 2.1 | 9.2 | .1 | .1 | 100.0 | 88.4 | 512 |
| | Rural | 31.0 | 4.4 | 3.6 | 6.0 | 51.8 | .6 | 2.5 | 100.0 | 39.1 | 339 |
| Nivel educativo de las mujeres | Sin instrucción | 14.4 | .9 | 1.4 | 7.6 | 68.2 | .0 | 7.6 | 100.0 | 16.6 | 68 |
| | Primaria | 48.8 | 3.8 | 2.5 | 5.0 | 38.4 | .6 | .9 | 100.0 | 55.1 | 425 |
| | Secundaria y + | 92.3 | 2.0 | .5 | 1.4 | 3.8 | .0 | .0 | 100.0 | 94.8 | 344 |
| | Otro | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 12 |
| | Missing/DK | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 100.0 | 2 |
| Total | | 64.5 | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 26.2 | .3 | 1.1 | 100.0 | 68.8 | 851 |

* Meta de la Cumbre Mundial de la Infancia = Número 11

Cuadro 40: Distribución porcentual de niños de 0-59 meses según si el nacimiento fue registrado o no, por razones para el “no registro”, Bolivia, 2000.

| | | Situación de registro y motivos de “no registro” | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-------|-----------------|
| | | El nacimiento fue registrado * | Cuesta demasiado | Debe ir muy lejos | No sabía que se debía registrar | No sabía donde registrar | Otro | Total | Número de niños |
| Sexo | Hombres | 82.5 | 2.8 | .6 | .0 | .0 | 13.3 | 100.0 | 1586 |
| | Mujeres | 80.6 | 3.1 | .7 | .1 | .1 | 14.2 | 100.0 | 1570 |
| Región | Altiplano | 85.8 | 2.9 | .8 | .1 | .1 | 9.4 | 100.0 | 1312 |
| | Valle | 80.8 | 2.4 | .8 | .0 | .0 | 15.1 | 100.0 | 1145 |
| | Llano | 74.8 | 4.1 | .1 | .0 | .2 | 19.6 | 100.0 | 698 |
| Area | Urbana | 83.0 | 2.2 | .2 | .0 | .1 | 13.5 | 100.0 | 1932 |
| | Rural | 79.2 | 4.2 | 1.4 | .2 | .1 | 14.0 | 100.0 | 1223 |
| Edad | < 6 meses | 41.0 | 6.4 | 2.8 | .0 | .1 | 46.7 | 100.0 | 348 |
| | 6-11 meses | 57.8 | 9.6 | 1.7 | .0 | .3 | 29.4 | 100.0 | 327 |
| | 12-23 meses | 82.2 | 3.0 | .6 | .1 | .1 | 12.9 | 100.0 | 642 |
| | 24-35 meses | 89.8 | 1.9 | .1 | .0 | .0 | 7.4 | 100.0 | 630 |
| | 36-47 meses | 93.9 | .8 | .2 | .2 | .1 | 4.8 | 100.0 | 572 |
| | 48-59 meses | 96.1 | .8 | .0 | .0 | .0 | 2.6 | 100.0 | 636 |
| Nivel educativo de la madre | Sin instrucción | 80.4 | 6.5 | 1.8 | .6 | .5 | 9.8 | 100.0 | 295 |
| | Primaria | 78.0 | 3.5 | .7 | .0 | .1 | 16.4 | 100.0 | 1608 |
| | Secundaria y + | 86.4 | 1.5 | .3 | .0 | .0 | 11.4 | 100.0 | 1211 |
| | Otro | 87.5 | .0 | 4.2 | .0 | .0 | 6.0 | 100.0 | 39 |
| | Missing/DK | 100.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 100.0 | 2 |
| Total | | 81.6 | 3.0 | .7 | .1 | .1 | 13.7 | 100.0 | 3155 |

* *Indicador para monitorear los Derechos del Niño.*

Cuadro 41: Distribución porcentual de niños de 0-14 años en hogares donde no vive uno de los padres biológicos, Bolivia, 2000.

| | | Condición de residencia | | | | | | | | | | Total | No vive con un padre biológico * | Uno o ambos padres muertos * | Número de niños |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Viven con ambos padres | Viven con ninguno de los padres | | | | Viven sólo con la madre | | Viven sólo con el padre | | | | | | |
| | | | Sólo el padre está vivo | Sólo la madre está viva | Los dos están vivos | Los dos están muertos | El padre vivo | El padre muerto | La madre viva | La madre muerta | Imposible determinar | | | | |
| Sexo | Hombres | 80.8 | .2 | .2 | 3.0 | .2 | 10.8 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | .4 | 100.0 | 3.6 | 3.9 | 4045 |
| | Mujeres | 80.2 | .3 | .1 | 3.2 | .4 | 10.8 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | .4 | 100.0 | 4.0 | 4.3 | 4042 |
| Región | Altiplano | 81.7 | .1 | .1 | 2.2 | .2 | 9.6 | 3.1 | .8 | 1.8 | .4 | 100.0 | 2.6 | 5.3 | 3442 |
| | Valle | 79.8 | .3 | .2 | 3.2 | .6 | 11.7 | 1.9 | 1.2 | .7 | .4 | 100.0 | 4.3 | 3.8 | 2618 |
| | Llano | 79.5 | .4 | .2 | 4.6 | .0 | 11.7 | 1.1 | 1.4 | .8 | .3 | 100.0 | 5.1 | 2.5 | 2026 |
| Área | Urban | 78.9 | .2 | .1 | 3.5 | .1 | 12.7 | 1.9 | 1.6 | .6 | .4 | 100.0 | 3.9 | 3.0 | 4866 |
| | Rural | 82.9 | .2 | .2 | 2.5 | .6 | 7.9 | 2.7 | .4 | 2.1 | .5 | 100.0 | 3.6 | 5.8 | 3220 |
| Edad | 0-4 años | 83.8 | .1 | .0 | 2.1 | .3 | 11.4 | 1.0 | .3 | .6 | .3 | 100.0 | 2.5 | 2.0 | 3174 |
| | 5-9 años | 81.0 | .3 | .2 | 3.3 | .2 | 10.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | .5 | 100.0 | 4.1 | 3.9 | 2618 |
| | 10-14 años | 75.5 | .4 | .2 | 4.3 | .3 | 10.9 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | .3 | 100.0 | 5.2 | 7.3 | 2295 |
| Total | | 80.5 | .2 | .1 | 3.1 | .3 | 10.8 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | .4 | 100.0 | 3.8 | 4.1 | 8086 |

* *Indicador para monitorear los Derechos del Niño*

Cuadro 42: Distribución porcentual de niños de 0-14 años que trabajan en la actualidad, Bolivia, 2000.

| | | Trabaja por paga | Trabaja sin paga | Trabajo doméstico por menos de cuatro horas /día | Trabajo doméstico por más de cuatro horas /día | Trabajo familiar en comercio o parcela | Trabaja actualmente * | Número de niños |
|--------------|------------|------------------|------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| Sexo | Hombres | 3.3 | .5 | 74.6 | 2.5 | 22.86 | 27.1 | 2451 |
| | Mujeres | 1.3 | .2 | 77.2 | 5.2 | 20.52 | 25.7 | 2461 |
| Región | Altiplano | 2.2 | .6 | 73.9 | 2.1 | 29.89 | 32.4 | 2122 |
| | Valle | 1.7 | .1 | 80.1 | 7.5 | 21.60 | 28.7 | 1472 |
| | Llano | 3.2 | .2 | 74.4 | 2.6 | 8.59 | 14.1 | 1319 |
| Área | Urbana | 2.3 | .2 | 74.1 | 1.9 | 6.91 | 10.8 | 2924 |
| | Rural | 2.3 | .5 | 78.5 | 6.8 | 43.41 | 49.3 | 1989 |
| Edad | 5-9 años | .4 | .2 | 70.5 | 1.6 | 15.88 | 17.6 | 2618 |
| | 10-14 años | 4.5 | .5 | 82.1 | 6.5 | 28.31 | 36.4 | 2295 |
| Total | | 2.3 | .3 | 75.9 | 3.9 | 21.69 | 26.4 | 4913 |

* *Indicador para monitorear los Derechos del Niño*